



## Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020

### Misura 16

### Sottomisura 16.2

### intervento 16.2.2

Azienda : \_\_\_\_\_

FATTORE DI PRODUZIONE	TIPOLOGIA MOTIVO	SOLUZIONI CONSIGLIATE	AUMENTI DEL PESO MEDIO CARCASSA CONSEGUIBILI (Valore massimo)
CONDIZIONAMENTO DEI CAPI DA VENDERE PER L'INGRASSO	NON EFFETTUATO	Nei 30 giorni precedenti la cessione è opportuno effettuare trattamenti antiparassitari e abituare i vitelli alle razioni previste nelle fasi successive. Si riduce così lo stress dovuto al cambio di stalla e di alimentazione e al rimescolamento degli animali. I costi possono essere compensati dal maggior valore dei capi alla vendita. Chi acquista per l'ingrasso dovrebbe provvedere al condizionamento dei capi che non siano stati trattati all'origine prima di immetterli nei ricoveri definitivi. Occorre limitare lo stress nelle fasi che precedono il trasporto, in particolare durante il carico. somministrare alimento e acqua di abbeverata a volontà prima del trasporto. allo scarico i vitelli devono trovare disponibili fieno di alta qualità, concentrato e acqua a volontà. attuare le profilassi vaccinali e antiparassitarie. sostituire gli abbeveratoi a pressione quando presenti.	Sino a oltre 30 kg / capo
VACCINAZIONI	NON EFFETTUATE	Prevedere trattamenti sistematici almeno una volta all'anno in funzione della necessità. In oltre devono essere messi in gruppi di almeno 20 soggetti ciascuno. una volta all'anno devono essere vaccinati, i vaccini usati sono polivalenti e servono a combattere le varie forme influenzali tra le più importanti sono IBR, parainfluenza 3, il BRV e la DVD.	Sino a 20 kg / capo

<b>AREAZIONE STALLE (comprende anche i LATI APERTI STALLA e VENTILAZIONE)</b>	MANCANZA CAMINI SUL TETTO IN RICOVERI CHIUSI SUI 4 LATI	Il ricambio dell'aria consente di tenere bassi l'umidità, il tasso di ammoniaca prodotto dalle fermentazioni ruminali e gli eventuali germi nocivi. Se possibile, realizzare sul colmo del tetto camini di areazione. In mancanza di aperture che permettono un costante ricambio dell'aria - anche tipo vasistas - è opportuno garantire quotidianamente l'areazione e il ricambio dell'aria tramite l'apertura dei serramenti nelle ore più favorevoli. Bisogna evitare però l'effetto tunnel nei ricoveri, proteggendoli dai venti dominanti con barriere frangivento.	Sino a 38 kg / capo
	DI CUI SENZA GRANDI APERTURE (FINESTRE O PORTE)	Nel caso non siano presenti ampie porte o finestre è consigliato di favorire il ricambio dell'aria con sistemi di ventilazione.	Sino a 20 kg / capo

<b>TRASPORTO</b>	STRESS DA TRASPORTO DEGLI ANIMALI	Le distanze e i tempi di percorrenza per i trasporti degli animali verso gli allevamenti da ingrasso e quelli verso i mattatoi risultano sufficientemente brevi e tali da non causare stress agli animali, come si evince dalle tabelle. Il trasporto verso la macellazione dei soggetti maturi viene fatto abitualmente lo stesso giorno dell'abbattimento del capo , pertanto gli animali si alimentano e bevono fino al momento del carico nel camion , tutti gli spostamenti devono essere fatti con la massima tranquillità , cercando di evitare la vista degli altri soggetti , nelcamion i soggetti devono essere divisi con apposite barriere di separazione , evitare lunghe distanze di percorrenza.	
------------------	-----------------------------------	---	--