



Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020

Misura 16

Sottomisura 16.2

intervento 16.2.2

Azienda : _____

FATTORE DI PRODUZIONE	TIPOLOGIA MOTIVO	SOLUZIONI CONSIGLIATE	AUMENTI DEL PESO MEDIO CARCASSA CONSEGUIBILI (Valore massimo)
CONDIZIONAMENTO DEI CAPI DA VENDERE PER L'INGRASSO	NON EFFETTUATO	Nei 30 giorni precedenti la cessione è opportuno effettuare trattamenti antiparassitari e abituare i vitelli alle razioni previste nelle fasi successive. Si riduce così lo stress dovuto al cambio di stalla e di alimentazione e al rimescolamento degli animali. I costi possono essere compensati dal maggior valore dei capi alla vendita. Chi acquista per l'ingrasso dovrebbe provvedere al condizionamento dei capi che non siano stati trattati all'origine prima di immetterli nei ricoveri definitivi. Occorre limitare lo stress nelle fasi che precedono il trasporto, in particolare durante il carico. somministrare alimento e acqua di abbeverata a volontà prima del trasporto. allo scarico i vitelli devono trovare disponibili fieno di alta qualità, concentrato e acqua a volontà. attuare le profilassi vaccinali e antiparassitarie. sostituire gli abbeveratoi a pressione quando presenti.	Sino a oltre 30 kg / capo
TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI	NON EFFETTUATI	Prevedere trattamenti sistematici almeno una volta all'anno in funzione della necessità. I vitelli all'arrivo devono essere separati dai soggetti già presenti e sottoposti ai trattamenti antiparassitari. In oltre devono essere messi in gruppi di almeno 20 soggetti ciascuno. il prodotto maggiormente utilizzato è l'ivomec ed è un antiparassitario ad ampio spettro di azione.	Sino a 11 kg / capo

TRASPORTO	STRESS DA TRASPORTO DEGLI ANIMALI	<p>Le distanze e i tempi di percorrenza per i trasporti degli animali verso gli allevamenti da ingrasso e quelli verso i mattatoi risultano sufficientemente brevi e tali da non causare stress agli animali, come si evince dalle tabelle. Il trasporto verso la macellazione dei soggetti maturi viene fatto abitualmente lo stesso giorno dell'abbattimento del capo, pertanto gli animali si alimentano e bevono fino al momento del carico nel camion, tutti gli spostamenti devono essere fatti con la massima tranquillità, cercando di evitare la vista degli altri soggetti, nel camion i soggetti devono essere divisi con apposite barriere di separazione, evitare lunghe distanze di percorrenza.</p>	
------------------	-----------------------------------	--	--